

Nombre del paciente: _____ Fecha de nacimiento: _____

Nombre del garante: _____ Fecha completada: _____

Educación para pacientes sobre Mamoplastia Feminizante

Consideraciones clínicas y quirúrgicas afirmativas de género.

- Algunas personas transexuales, transgénero, y de género no conforme eligen tener una cirugía para tratar la disforia de género severa mientras otras no. Esta elección está basada en preferencias personales y necesidades médicas.
- La cirugía puede tener un impacto inesperado o involuntario en la disforia de género en algunos pacientes.
- La cirugía no es un requisito para llevar a cabo la transición legal. No es necesario someterse a una cirugía para realizar una transición jurídica completa.

¿Qué es la cirugía mamoplastia feminizante?

- La mamoplastia feminizante, también llamada aumento de senos o “implantes mamarios”, coloca bolsas salinas o de silicona en el área de la mama para crear senos más grandes y de apariencia femenina.
- La mamoplastia feminizante puede hacerse usando varios procedimientos. El tipo de mamoplastia feminizante se basa en el desarrollo actual de los senos, la forma y el tamaño del torso y el cuerpo, el tamaño y la forma deseados de los senos, otros factores anatómicos y las necesidades y preferencias de cada paciente.
- Hay varios tipos y tamaños de implantes mamarios. El tipo de implante mamario se basa en el desarrollo actual de los senos, la forma y el tamaño del torso y el cuerpo, el tamaño y la forma deseados de los senos, otros factores anatómicos y las necesidades y preferencias de cada paciente.
- Las cicatrices visibles dependen del tipo de cirugía que se realice.
- El cirujano y su paciente determinan el tipo de procedimiento y de implante durante la cita previa a la cirugía.
- Los implantes mamarios son mucho más seguros y más eficaces que las inyecciones de silicona.
- La cirugía de mamoplastia feminizante suele tardar de 1 a 3 horas en el quirófano.
- Se recomienda que antes de someterse a la mamoplastia feminizante, los pacientes vean fotografías, si las hay, de algunos resultados obtenidos por el cirujano que elijan.
- La mamoplastia feminizante no tiene ningún efecto sobre los niveles hormonales.
- Feminizing mammoplasty does not cause loss of fertility
- La mamoplastia feminizante no causa pérdida de fertilidad.
- La mamoplastia feminizante no aumenta el riesgo de cáncer de mama.

¿Cómo es la atención posterior a la cirugía de mamoplastia feminizante?

- El aumento de senos por lo general requiere 1 semana de recuperación antes de poder volver a realizar trabajo de escritorio y no se pueden hacer actividades extenuantes durante 2 a 4 semanas.
- Puede ser necesario utilizar tubos de drenaje en el periodo inmediatamente posterior a la cirugía.
- En casos poco comunes la mamoplastia feminizante requiere 2 cirugías con algunos meses de separación.
- El tiempo de recuperación de la mamoplastia feminizante depende del tipo de procedimiento realizado. Por lo general no se requiere que el paciente permanezca en el hospital durante la noche.
- El cirujano le proporcionará instrucciones completas para la preparación previa a la operación y el cuidado posoperatorio.

¿Cuáles son los riesgos y posibles complicaciones de la cirugía de mamoplastia feminizante?

- Fumar cigarrillos puede interferir con la cicatrización de heridas y es muy recomendable dejar de hacerlo antes de la cirugía. Algunos cirujanos no realizarán la operación a menos que los pacientes hayan dejado de fumar de 2 a 6 semanas antes de la cirugía.
- Los cirujanos no operarán a menos que los pacientes dejen de tomar nicotina y fumen entre 2 y 6 semanas antes de la cirugía.
- La FDA advierte sobre los diferentes riesgos de los implantes mamarios, los cuales incluyen: la necesidad de cirugías adicionales (con o sin extracción del artículo); contractura capsular (tejido de cicatrización que se forma alrededor del implante y aprieta el implante); dolor en los senos; cambios en la sensibilidad en los pezones y en los senos; ruptura con deflación de los implantes rellenos de solución salina; ruptura con o sin síntomas (ruptura silenciosa) de los implantes con gel de silicona.

¿Cuáles son las limitaciones de la cirugía de mamoplastia feminizante?

- La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) establece que los implantes mamarios no son artículos para toda la vida. Cuanto más tiempo tenga implantes una mujer, hay más probabilidades de que tenga que someterse a una cirugía para extraerlos
- La mamoplastia feminizante puede interferir con la detección de cáncer de mama hecha con mamografía. No se sabe si esto hace que la detección del cáncer de mama sea menos eficaz.
- In some cases, it may take up 1 year before patients are fully healed from surgery.

Toda la información en esta forma ha sido repasada con migo, comprendo su contenido y todas mis preguntas han sido contestadas.

Paciente / Firma del paciente

He repasado toda la información en esta forma con mi paciente/cliente y estoy seguro/a de que mi paciente/cliente comprende esta información.

Nombre y firma del proveedor médico