

Fecha _____

Nombre _____

Fecha de nacimiento _____

Educación para pacientes sobre mastectomía subcutánea con construcción de pecho masculino

- Algunas personas transexuales, transgénero y con inconformidad de género deciden someterse a una cirugía para tratar la disforia de género grave, y otras no lo hacen. Ésta es una decisión basada en las preferencias personales y las necesidades médicas.
- No es necesario someterse a una cirugía para realizar una transición jurídica completa.
- La mastectomía subcutánea con construcción de pecho masculino (subcutaneous mastectomy, SCM) elimina la mayor parte del tejido mamario, aunque no todo, y crea un pecho con apariencia masculina.
- Los efectos de la cirugía son permanentes e irreversibles.
- La SCM no tiene ningún efecto sobre los niveles hormonales.
- La SMC no causa la pérdida de la fertilidad, pero causa la pérdida de la capacidad de amamantar.
- La SCM puede requerir una mamografía antes de que el cirujano realice el procedimiento.
- La SCM puede hacerse usando varios procedimientos. El tipo de SCM se basa en el tamaño del seno, la elasticidad de la piel, otros factores anatómicos y las necesidades y preferencias de cada paciente, y el cirujano lo determina durante el examen preoperatorio.
- La cirugía de SCM suele tardar de 2 a 4 horas en el quirófano.
- La SMC a veces se puede hacer al mismo tiempo que la histerectomía.
- Las cicatrices visibles dependen del tipo de cirugía que se realice.
- La pérdida de sensación en los pezones es un riesgo frecuente, dependiendo de la cirugía realizada y de cada paciente.
- Se recomienda que antes de someterse a la SCM, los pacientes vean fotografías, si las hay, de algunos resultados obtenidos por el cirujano que elijan.
- Puede ser necesario utilizar tubos de drenaje y una faja de compresión en el periodo inmediatamente posterior a la cirugía.
- El tiempo de recuperación de la SCM depende del tipo de procedimiento realizado. Por lo general no se requiere que el paciente permanezca en el hospital durante la noche.
- La SCM por lo general requiere 1 semana de recuperación antes de poder volver a realizar trabajo de escritorio y no se pueden hacer actividades extenuantes durante 2 a 4 semanas.
- Fumar cigarrillos puede interferir con la cicatrización de heridas y es muy recomendable dejar de hacerlo antes de la cirugía. Algunos cirujanos no realizarán la operación a menos que los pacientes hayan dejado de fumar de 2 a 6 semanas antes de la cirugía.
- El cirujano le proporcionará instrucciones completas para la preparación previa a la operación y el cuidado posoperatorio.

Se revisó conmigo toda la información de este formulario, la entiendo y todas mis preguntas fueron contestadas

Firma del paciente/cliente

He revisado toda la información de este formulario con mi paciente/cliente y estoy seguro de que mi paciente/cliente entiende esta información

Nombre y firma